PMRA APPROVED – MFW
2013-2054
JUNE 2013

Biofongicide sous forme de poudre mouillable
Pour usage sur les tomates et concombres de serre,
Courges et concombres (sous-groupe 9B)

INFLUENCE WP

COMMERCIAL

GARANTIE : Poudre d'ail…..70,1%

NUMÉRO D'HOMOLOGATION 29667
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

SENSIBILISANT POTENTIEL POUR LA PEAU
ATTENTION – IRRITANT POUR LES YEUX
ATTENTION - IRRITANT POUR LA PEAU

CONTENU NET : 10 kilogrammes

Fabriqué par :
AEF Global Inc.
201, Mgr-Bourget
Lévis, QC
G6V 6Z3
(418) 838-4441

Ligne d'assistance sans frais : 1-866-622-3222
www.aefglobal.com

MODE D'EMPLOI :

Utiliser une bouillie d'arrosage fraîchement préparée à chaque nouvelle application

EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement des serres contenant ce produit d'atteindre les lacs, les cours d'eau, les étangs et tout autre plan d'eau.

Influence WP est une poudre mouillable contenant de la poudre d'ail comme matière active. Influence WP s'attaque aux champignons qui causent le blanc, le mildiou, pourriture des semences/fonte de semis en pré-émergence et pourriture racinaire sur les concombres de serre et les tomates de serre. Influence WP s'attaque aussi au blanc dans les cucurbitacées du sous-groupe 9B. Influence WP devrait être appliqué préventivement ou dès l'apparition des premiers signes d'infection. Des applications répétées et une couverture complète du feuillage sont nécessaires pour maintenir une bonne répression de la maladie.

Le délai d'attente avant la récolte (DAR) est 0 (zéro) jour.

MODE D'APPLICATION :
Utiliser la quantité d'Influence WP requise dans un volume d'eau propre approprié pour bien couvrir le feuillage. Il est recommandé de remplir le réservoir ou le pulvérisateur avec une certaine quantité d'eau propre avant d'ajouter l'Influence WP pour éviter qu'il se dépose. Agiter constamment afin de maintenir la suspension.

TOMATES ET CONCOMBRES DE SERRE

Application foliaire : Blanc et mildiou - Appliquer Influence WP en pulvérisation foliaire sur les tomates et les concombres de serre afin de réprimer le champignon. Appliquer à raison de 6,9 kg/ha dans un taux de dilution de 1000L/ha. Les applications subséquentes peuvent être faites aux 7 à 14 jours si les symptômes persistent. Mildiou – En plus de l'application foliaire, appliquer la solution sur la surface du substrat.

Application au substrat : Pourriture des semences/fonte de semis en pré-émergence et pourriture racinaire - Utiliser la quantité d'Influence WP requise dans un volume d'eau propre approprié pour bien couvrir le substrat. Il est recommandé de remplir le réservoir ou le pulvérisateur avec une certaine quantité d'eau propre avant d'ajouter l'Influence WP pour éviter qu'il se dépose. Agiter constamment afin de maintenir la suspension. Appliquer au semis au taux de 10 à 20 kg dans 1000 L d'eau propre pour couvrir 300 m^2.

TAUX D'APPLICATION:

Culture	**Pathogènes**		**Taux (kg/ha)**
Tomate de serre	Répression du Blanc	*Oidium neolycopersici*	6.9 kg/ha
	Mildiou*	*Phytophthora infestans*	6.9 kg/ha
	Répression partielle de la pourriture des semences/fonte de semis en pré-	*Pythium* spp. *Rhizoctonia solani*	10 to 20 kg/300m^2 Pour la répression ou lorsque les conditions

	émergence et pourriture racinaire		sont propices au développement de la maladie, appliquer 20 kg/300m^2.
Concombre de serre	Répression du Blanc	*Podosphaera xanthii*	6.9 kg/ha
	Mildiou*	*Pseudoperonospora cubensis*	6.9 kg/ha
	Répression partielle de la pourriture des semences/fonte de semis en pré-émergence et pourriture racinaire	*Pythium* spp. *Rhizoctonia solani*	10 to 20 kg/300m^2 Pour la répression ou lorsque les conditions sont propices au développement de la maladie, appliquer 20 kg/300m^2.

*Peut inhiber les symptômes du mildiou lorsqu'utilisé de paire avec des mesures de lutte intégrée.

SOUS-GROUPE 9B : COURGES/CONCOMBRES SOUS-GROUPE INCLUANT LES CITROULLES ET LES COURGES D'ÉTÉ ET D'HIVER

Application foliaire : Blanc - Appliquer Influence WP en pulvérisation foliaire sur la culture afin de réprimer le champignon. Appliquer à raison de 6,9-8 kg/ha dans un taux minimum de dilution de 700L/ha. Les applications subséquentes peuvent être faites aux 7 à 14 jours si les symptômes persistent. Ne pas appliquer plus de 4 applications par saison.

TAUX D'APPLICATION :

Culture	**Pathogène**		**Taux (kg/ha)**
Sous-Groupe 9B : Courges/Concombre Sous-Groupe Incluant les Citrouilles et les Courges d'Été et d'Hiver	Répression du Blanc	*Sphaerotheca fuliginea (*syn. *Podosphaera xanthii*) *Erysiphe cichoracearum*	6.9-8.0 kg/ha

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Sensibilisant potentiel pour la peau.
Peut irriter les yeux.
Peut irriter la peau.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter d'inhaler les particules de poussières et les brouillards de pulvérisation

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, de gants imperméables, des chaussures et des chaussettes ainsi que des lunettes de protection pour manipuler, mélanger, charger et appliquer le produit et durant toute activité de nettoyage et de réparation. De plus, les préposés au mélange et au chargement doivent porter un respirateur qui filtre les particules et les brouillards (masque antipoussière) de classe N-95, R-95, P-95 ou HE (norme minimale), et les

applicateurs utilisant un pulvérisateur à moteur doivent porter un respirateur doté d'un dispositif de retenue de type cartouche à baïonnette (pour les particules) et d'un filtre N-95, R-95, P-95 ou HE. NE PAS circuler ou permettre à quiconque de circuler dans les sites traités jusqu'à ce que le produit pulvérisé soit sec.
Peut irriter les voies respiratoires.

Les personnes sensibles ou allergiques à l'ail devraient éviter de manipuler le produit.

La manipulation et le chargement d'Influence WP ainsi que les activités de nettoyage et d'entretien doivent se faire dans un endroit bien aéré.

Les personnes sans protection devront demeurer à l'extérieur des sites traités pendant toute la durée du traitement.

Ne doit être appliqué que lorsque le risque de dérive vers des secteurs habités ou des aires d'activité humaine (par exemple, maisons, chalets, écoles et aires de récréation) est faible, compte tenu de la vitesse et de la direction du vent, de l'inversion ou non des températures, du matériel d'application et des réglages du pulvérisateur.

PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter les symptômes.

ENTREPOSAGE
Conserver le contenant bien fermé à l'écart de la lumière directe du soleil et à des températures

entre 4 ° et 20° C. Une température d'entreposage plus froide est préférable. Pour éviter tout risque de contamination, entreposer ce produit loin de la nourriture pour les humains ou pour les animaux.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.

2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.

3. Rendre le contenant vide inutilisable.

4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage de déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires.* L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou des dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.